

किसान बहिनों एवं भाईयों, नमस्कार ! अक्टूबर माह जिसे आप आश्विन-कार्तिक भी कहते हैं, नवरात्रों, दशहरा तथा करवा चौथ के त्यौहारों से जुड़ा हुआ है। देश के राष्ट्रपिता महात्मागांधी तथा बाल्मिकी जन्मदिन भी इसी माह में आते हैं। खरीफ फसलों की भरपूर पैदावार एक तरफ खुशियां विखेर रही है तो दूसरी तरफ रबी मौसम की तैयारी भी शुरू करनी है। हम आपके प्रश्नों पर आधारित अक्टूबर माह में होने वाले कृषि कार्य बताएंगे। लेख में सभी नाप-तोल प्रति एकड़ के हिसाब से हैं।

### तीन जरूरी बातें -

- ❖ **मिट्टी परीक्षण (मिट्टी का ज्योतिषी)** - अक्टूबर माह में खेत खाली होने पर मिट्टी के नमूने ले लें। ३ वर्षों में एक बार अपने खेत का मिट्टी परीक्षण अवश्य करवाएं ताकि मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों (नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, लोहा, तांबा, मैंगनीज व अन्य) की मात्रा तथा फसलों में कौन सी खाद कब व कितनी मात्रा में डालनी है, का पता चल सके।
- ❖ **अन्न भण्डारण (खाद्य सुरक्षा)** खरीफ की फसलों के दानों को कीड़े बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे बचाव के लिए अन्न को धूप में अच्छी तरह सुखा लें तथा साफ कर लें। गोदान व अन्न के ढोलों में सुराख व दरारें अच्छी तरह बंद कर लें। नई बोरियां प्रयोग में लाएं तथा उनको ०.१ प्रतिशत मैलाथियान के घोल में १०-१५ मिनट डुबोये फिर छाया में सुखाकर आनाज के ठंडा होने पर भंडारण करें। चना व अन्य दालों पर सरसों या मूंगफली का तेल ७.५ मि.ली. प्रति कि.ग्रा. दानों की दर से अच्छी तरह मसल लें।
- ❖ **फसल विविधीकरण (लाभदायक कृषि)** - आजकल गेहूं की काश्त में लाभ ना के बराबर रह गया हैं परंतु राया/सरसों से १२०० रुपये शुद्ध लाभ हो सकता है। गन्ने से भी ५०० रुपये से अधिक लाभ नहीं मिलता परंतु गैदा जैसे फूलों की खेती या सब्जियां उगाने से या चारा बोन से लाभ ही लाभ मिलता है तथा बेचने की भी कोई समस्या नहीं।

**धान** - की कटाई से एक सप्ताह पहले खेत से पानी निकाल दें। जब पोधें पीले पडने लगे तथा वालियां लगभग पक जायें तो कटाई उन्नत हासिएं या कवाईन मशीनों से करें। देर करने पर दाने खेत में ही झड़ जाते हैं तथा पैदावार कम मिलती है। सूखी फसल की गहाई पैडी सौशर से भी कर सकते हैं। धान को १२ प्रतिशत नमी तक सुखाकर भण्डारण करें।

**कपास** - देशी कपास की चुनाई ८-१० दिन के अन्तर पर करते रहे। अक्टूबर में अमेरिकन कपास भी चुनाई के लिए तैयार है, इसे १५-२० दिन के अन्तर पर चुने व सूखें गोदामों में रखें। यदि चित्तीदार सुंडी, गुलाबी सुंडी, कुबडा कीडा का प्रकोप नजर आये तो जुलाई में बताई विधि से दवाईयों का छिड़काव करें।

**अरहर** - अक्टूबर में सिंचाई न करें नहीं तो फसल जल्दी नहीं पकेगी। अरहर में ५० प्रतिशत फलियां लगने पर ६०० मि.ली. एण्डोसल्फान ३५ ई.सी को ३०० लीटर पानी में घोलकर छिड़कें इससे फली छेदक की रोकथाम हो सकेगी। अरहर अक्टूबर के अन्त तक पक जाती है।

**मूंगफली** - मानसून के बाद चेपा मूंगफली के पोधों का रस चूसता है जिसकी रोकथाम के लिए २०० मि.ली. मैलाथियान ५० ई.सी. को २०० लीटर में मिलाकर छिड़कें। अक्टूबर के अन्त में या नवम्बर के शुरू में मूंगफली फसल में आखिरी सिंचाई कर दें। इससे भरपूर फलियों निकलती है व फसल खुदाई भी आसान हो जाती है। बची हुई नमी अगली फसल बोन के काम भी आ जाती है। ट्रैक्टर से चलने वाला मूंगफली खुदाई यंत्र से पूरी पैदावार मिलती है।

**गन्ना** - अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में शरदकालीन गन्ना लग सकता है जिसमें लाईनें २ फुट दूर रखें यदि लाईनें ३ फुट दूर रखें तो बीच में एक लाईन आलू लगा दें। आलू के लिए खाद अतिरिक्त दें। वाकी कृषि क्रियाओं के लिए अप्रैल का लेख देखें। गन्ने में २५ दिनों के अन्तर पर सिंचाई करते रहे। अक्टूबर में पायरिल्ला (घोडा) कीडा गन्ने का रस चूसता है तथा गुरदासपुर व अगोला वेधक गन्ने में सुराख कर देते हैं। इनकी रोकथाम के लिए अप्रैल व जून माह के लेख देखें। कीडाग्रस्त क्षेत्रों में पानी खडा न रहने दें तथा गन्ने के निचले भाग से २-३ बार पत्तियां उतारने के बाद ०.१ प्रतिशत मैलाथियान छिड़कें। रक्ता, सोका या कंडुआ रोग लगने की दशा में रोगी पोधें को खेत से निकाल दें तथा मोठी फसल न लें तथा अन्य फसल चक्र अपनाएं।

**सरसों, तोरिया, राया व तारामीरा** - सरसों व राया १० अक्टूबर तक तथा तारामीरा सारे अक्टूबर माह में बीज सकते हैं। बीजाई संबंधी क्रियायें सितम्बर माह में बता चुके हैं। सितम्बर में बोई तोरिया व सरसों में आधा बोरा

यूरिया पहली सिंचाई पर दे दें। अक्टूबर माह में लाल बालों वाली सुण्डियों व सरसों की आरा मक्खी फसलों को नुकसान करती है। सुण्डियां समुह में होने पर पत्तियां तोड़कर नष्ट कर दें तथा ५०० मि.ली. एण्डोसल्फान ३५ ई.सी. को २०० लीटर पानी में घोलकर छिड़के। चितकबरा कीड़े के लिए २०० मि.ली. मैलाथियान ५० ई.सी. को २०० लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। बीमारियों से बचाव के लिए रोगरहित बीज चुने व समय पर बीजाई करें।

**गेहूं** - बारानी क्षेत्रों में गेहूं, खरीफ मौसम की बची-खुची नमी के सहारे, अक्टूबर माह के चौथे सप्ताह से बीज सकते हैं जबकि तापमान लगभग २२० सैल्सियस होना चाहिए। इसके लिए उचित किस्में सी-३०६, डब्ल्यू.एच-५३३, पीबी डब्ल्यू-३९६, पी.वी. डब्ल्यू-२९९ व पी.वी.डब्ल्यू-१७५ है। ४० कि.ग्रा. बीज को ६० मि.ली. क्लोरपाइरीफास २० ई.सी. उपचार से दीमक तथा फिर ८० ग्राम बीटावैक्स या वैविस्टिन के सुखे-उपचार से खुली कंगियारी (गेहूं की वालियां का काले पाऊंडर में बदलना) से फसल बचाव होता है। बीजाई ८ ईंच दूर लाईनों २-३ ईंच गहरा करें। बीजाई जीरो टिल मशीन से करने से कम खर्चा व अधिक पैदावार मिलती है। बीजाई के समय आधा बोरा यूरिया, एक बोरा सिंगल सुपरफासफेट, आधा बोरा म्यूरैट आफ पोटास तथा १०-२५ कि.ग्रा. जिंक सल्फेट डालें। खरपतवारनाशक ३ सप्ताह बाद तथा पहली सिंचाई से १-२ दिन पहले छिड़के।

**जौ** - जौ बारानी क्षेत्रों तथा रेतीली, कमजोर मिट्टियों के लिए उपयुक्त फसल है। फसल की पी.एल-४१९, पी.ए-४२६, पी.एल-१७२, सी-१३८, सी-१६४, बी.जी-२५, बी.एच-७५, बी.जी-१०५ व बी.एच-३९३ किस्मों को १५ अक्टूबर से १५ नवम्बर तक बो सकते हैं। ३५ कि.ग्रा. बीज को १०० ग्राम बीटावैक्स और १०० ग्राम थीराम से उपचारित करने के बाद बीमारियों से बचाव हो जायेगा। खेत को २-३ जुताई तथा सुहागा देकर उपचारित बीज को ८ ईंच दूर लाईनों में बीजें। बीजाई के समय आधा बोरा यूरिया व एक बोरा सिंगल सुपरफासफेट डालें। ५०० ग्राम एजोटोवैक्टर डालने से फसल में नाईट्रोजन की कमी नहीं होती है। फिर आधा बोरा यूरिया एक महीने बाद वर्षा आने पर डाल दें।

**शरदकालीन मक्की** - यह मक्की २५ अक्टूबर से १० नवम्बर तक सफलतापूर्वक बोई जा सकती है तथा अप्रैल-मई में तैयार हो जाती है इसमें बीमारियां भी कम लगती हैं। इसके लिए किस्में एच.एच.एम-१, -२, गंगा-५, विजय कम्पोजिट, प्रताप-१ व शीतल उपयुक्त है। १० कि.ग्रा. बीज को ४० ग्राम थीराम से उपचारित करके दूरी २ फुट लाईनों में तथा ८ ईंच पोथें में रखकर २-३ ईंच गहरा बोयें। लाईन पूर्व से पश्चिम दिशा में होने से धूप अच्छी आती है तथा पैदावार बढ़ती है। वाकी सभी क्रियायें सामान्य मक्का की तरह करें जोकि हम पिछले लखों में बता चुके हैं।

**अलसी** - इस फसल को चिकनी-दोमट अच्छे जल निकास वाली मिट्टी में तथा धान की फसल के बाद उगाया जाता है। अलसी की के-२, एल सी २०२३ व एल सी-५४ किस्मों के २० कि.ग्रा. बीज को ६० ग्राम थीराम से उपचारित करके ८ x ४ ईंच दूरी पर १-१५ अक्टूबर तक लगायें। बीजाई पर एक बोरा यूरिया दें तथा ३-४ सिंचाईयां करें जिसमें एक फूल खिलने पर दें।

**चना** - चना अच्छी जल निकास वाली दोमट रेतीली तथा हल्की मिट्टियों में अच्छा होता है। खारी व कल्लर वाली मिट्टी जहां पी.एच ८.५ से अधिक, सेमवाली या जहां पानी का स्तर ऊंचा है, चना न लगायें। बारानी क्षेत्रों में देसी चना १०-२५ अक्टूबर तक लगा दें। सिंचित क्षेत्रों में देसी व काबुली चने २५ अक्टूबर से १० नवम्बर तक लगा सकते हैं। बीजाई के समय तापमान ३०० सैल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। देसी चने की उन्नत किस्में पी डी जी-३ व ४, जी पी एफ-२, पी वी जी-१, जी एल-७६९, सी-२३५, एच-२०८, जी-२४, हरियाणा चना-१ व ३ गोरव तथा काबुली चने में एच-१४४, गोरा हिसारी, हरियाणा काबुली-१, वी जी-१०५३, एल-५५१, एल-५५० है। गहरी जुताई से बीमारियां तथा खरपतवार कम आते हैं। देसी चना १८ तथा काबुल ३६ कि.ग्रा. बीज को बीमारियों से बचाव के लिए १.५ ग्राम वैवीस्टिन तथा १.५ ग्राम थीराम प्रति कि.ग्रा. बीज के हिसाब से उपचारित करें। फिर दीमक के लिए ५०० मि.ली. क्लोरपाइरीफास २० ई.सी. को १ लीटर घोल से उपचारित करें। फिर राइजोवियम जैव खाद से उपचारित करके बीजाई के समय १५ कि.ग्रा. यूरिया, देसी चने में एक तथा काबुली चने में दो सिंगल सुपरफासफेट बोरा दें। १० कि.ग्रा. जिंक सल्फेट भी दें। बीज को १ फुट दूर लाईनों में तथा ८-९ ईंच गहरा बोयें।

**मसूर** - मसूर की उन्नत किस्मों में एल ९-१२, सपना, गरिमा, एल एल -६९९, व -१४७ व -५६ को अक्टूबर के अन्त से नवम्बर के दूसरे सप्ताह तक बीज दें। १५ कि.ग्रा. बीज को ३० ग्राम कैप्टान से उपचारित कर फिर एक पैकेट मसूर राइजोवियम जैव खाद से उपचारित करके १७ ईंच दूर लाईनों में बोयें। बीजाई के समय १२ कि.ग्रा. यूरिया व २ बोरे सिंगल सुपरफासफेट डाल दें। १० कि.ग्रा. जिंक सल्फेट भी डालें।

**दाल मटर** - इसे अक्टूबर अन्त से १५ नवम्बर तक लगाते हैं। उन्नत किस्मों में फील्ड पी-४८, पी.जी.-३, अपर्णा, जयन्ती, उत्तरा व टाईप-१६३ है। ३०-३५ कि.ग्रा. बीज को ७-१२ ईंच दूरी पर लाईनों में लगायें। बीमारियों के लिए ७० ग्राम वाविस्टिन से बीजोपचार करें तथा मटर राईजोवियम जैव खाद से उपचारित करें। २० कि.ग्रा. यूरिया तथा १ बोरा सिंगल सुपर फासफेट बीजाई पर डालें।

**सब्जियां** - प्याज की नर्सरी १५ अक्टूबर से १५ नवम्बर तक ऊंची उठी शैय्या पर लगायें। प्याज की उन्नत किस्मों में अर्ली ग्रनों, पूसा रैड, पूसा रतनार, पूसा व्हाइट पलैट, पूसा व्हाइट राऊड व पूसा माधवी है। इससे पहले नर्सरी में कम्पोस्ट खाद मिलाकर शैय्या तैयार करें फिर ४ कि.ग्रा. बीज को नर्सरी में लगायें। टमाटर - टमाटर की विशेष फसल के लिए अक्टूबर के शुरू में बीजाई करके मध्य नवम्बर तक रोपाई कर दें। बोने से पहले, १५० ग्राम बीज को ०.५ ग्राम थीरम से उपचारित करें तथा हर १५ दिन बाद शाम के समय २ ग्राम थीरम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़कें। सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए नर्सरी में ०.१ प्रतिशत मैलाथियान १५ दिन के अन्तर पर छिड़कें। पुरानी टमाटर की फसल से रोगग्रस्त पौधों उखाड़कर जला दें। दवाईयों छिड़कने से पहले फल तोड़ लें। फूलगोभी - पूसा खोवाल-१ व पूसा खोवाल के-१ किस्में १५ अक्टूबर तक नर्सरी में बोई जा सकती है तथा ४ सप्ताह बाद खेत में रोपी जा सकती है। पुरानी फसल में १० दिन के अन्तर पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार नियंत्रण के लिए एक गुडाई भी करें तथा यूरिया की दूसरी किस्त १ बोरा, पहले किस्त के ३०-४० दिन बाद दे दें। कीड़ों से बचाव के लिए फूलगोभी पर ०.२ प्रतिशत मैलाथियान का छिड़काव करते रहें। पालक व मैथी - अक्टूबर में भी पालक व मैथी लगाये जा सकते हैं। सितम्बर में बोई फसल को ३० दिन बाद काट सकते हैं तथा हर कटाई के बाद आधा बोरा यूरिया डाल दें। सिंचाई हर सप्ताह करें। कीट-नियंत्रण ०.२ प्रतिशत मैलाथियान छिड़काव से हो जाता है। गाजर व मूली - जापानी व्हाइट मूली तथा पूसा केसर व पूसा मघाली गाजर अक्टूबर में बोई जा सकती है। सितम्बर में बोई फसल में आधा बोरा यूरिया डाल दें तथा १० दिन के अन्तर पर सिंचाई करें। कीट-नियंत्रण के लिए ०.२ प्रतिशत मैलाथियान छिड़कें। मटर - मटर अर्कल १५ अक्टूबर से ७ नवम्बर तक तथा वर्नवीला एवं लिंकन अक्टूबर अन्त से १५ नवम्बर तक बोया जा सकता है। बीजाई से पहले आधा बोरी यूरिया, ८ टन कम्पोस्ट, ३ बोरे सिंगल सुपर फासफेट, १ बोरा म्युरेट आफ पोटास खेत में डालें। ३० कि.ग्रा. बीज रातभर भिगोकर १-१.५ फुट दूर लाईनों में १ ईंच पौधों में दूरी रखकर बोयें। बीजाई के बाद हल्की सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए ६०० ग्राम स्टोम्प को ३५० लीटर पानी में घोलकर बीजाई के १-२ दिन के अन्तर पर खेत में छिड़कें फिर पहली सिंचाई २५-३० दिन बाद करें। कीट-नियंत्रण के लिए ०.१ प्रतिशत इण्डोसल्फान या मैलाथियान छिड़कें।

**बरसीम** - को अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक लगा सकते हैं। सितम्बर में लगी फसल में १० दिन के अन्तर पर सिंचाई करते रहें। रिजका (लुसर्न) भी चारे की अच्छी फसल है इसे गहरी अच्छे निकास वाली दोमट भूमि में १५ अक्टूबर से लगा सकते हैं। रिजका की उन्नत किस्में लुसर्न-९, एल एल कम्पोजिट-५ तथा लुसर्न-टी है। ५ कि.ग्रा. बीज को राइजोवियम जैव खाद लगाकर १ फुट दूर लाईनों में १-२ ईंच गहरा बोयें। बीजाई के समय आधा बोरा यूरिया तथा ४ बोरे सिंगल सुपरफासफेट को ८ ईंच गहरा ड्रिल करें। जई - १५ - ३० अक्टूबर तक जई बोने का उत्तम समय है। उन्नत किस्मों में ओ.एल-९, कैन्ट व हरियाणा जई है जोकि कई कटाईयां देती है। जई का २५ कि.ग्रा. बीज २५ ग्राम वीटावैक्स से उपचारित करके ७ ईंच दूर लाईनों में लगायें। बीजाई पूर्व सिंचाई बहुत लाभदायक रहती है। बीजाई के समय पौना बोरा यूरिया व १ बोरा सिंगल सुपर फासफेट खेत में डालें।

**ईसवगोल** - एक औषधीय फसल है जिसे अच्छे जल निकाल वाली मिट्टी तथा कम पानी वाले क्षेत्रों में १५ अक्टूबर से ७ नवम्बर के बीच लगा सकते हैं। इसके ३ कि.ग्रा. बीज को ९ ग्राम थीरम से उपचारित करें तथा ९ ईंच दूर लाईनों में १ ईंच से कम गहरा बोयें। बीजाई के पहले आधा बोरा यूरिया व आधा बोरा सिंगल सुपर फासफेट दें। पहला पानी एक माह बाद दें तथा बाद में आधा बोरा यूरिया दो लाईनों के बीच दें। दूसरी व तीसरी सिंचाई १ माह के अन्तर पर करें। गुडाई से खरपतवार पर नियंत्रण भी रखें।

**लहसुन** - की देसी किस्म की साफ २००-३०० कि.ग्रा० फांके 6x4 ईंच दूरी पर अक्टूबर माह में लगायें। खेत तैयार करते समय २० टन कम्पोस्ट, आधा बोरा यूरिया, १ बोरा सिंगल सुपर फासफेट तथा १ बोरा म्युरेट आफ पोटास दें। शेष आधा बोरा यूरिया नवम्बर माह में लहसुन की लाईनों के बीच डालें।

**फल**- पपीते को तना गलन रोग से बचाने के लिए खेत में पानी न खडा रहने दे। बीमारी फैलने पर २ ग्राम कैप्टान प्रति लीटर पानी में घोल कर १५ दिन बाद छिड़कें। नींबू में रोगग्रस्त टहनियां काट दें फिर ०.३ प्रतिशत कांपर-आक्सीक्लोराइड स्प्रे करें। बेट में ३-४ वर्ष से बड़े पौधों को ५०० ग्राम यूरिया देने से पहले सिंचाई भी करें।

**फूल-** किसान भाई खेती के साथ-साथ घर के आस-पास फूल भी उगायें । इससे अपने वातावरण को सुंदर बनाने तथा मन को शांति मिलती है । सितम्बर माह में बीजी नर्सरी से पौध को गमलों या क्यारियों में लगा दें । सर्दियों में खिलने वाले फूलों को अक्टूबर माह में भी बीज सकते है । गुलाब के पौधों की कांट-छांट व गुड़ाई भी कर सकते है । गुलदाऊदी पर जल्दी आई कलियों को तोड़ दें तांकि बाद वाले फूल बड़े आकर के हो । डहलिया को गमलों में लगा दें तथा घास के लान में वारीक कटाई के बाद हल्का यूरिया छिड़कें ।

किसान भाई अक्टूबर में होने वाली शेष कृषि क्रियाओं के बारे में जानकारी हेतु हमसे सीधा फोन (०१२०-२५३५६२८) अथवा ईमेल [krishipramarsh@kribhco.net](mailto:krishipramarsh@kribhco.net) से भी संपर्क कर सकते है ।